

Deliveries Statistics, Norrbotten, 1995-2011

Variabel	Mother's age	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Births, number	-19 years	76	55	58	46	51	57	52	33	43	54	45	52	47	53	57	36	54
	20 – 24 years	603	518	467	375	381	370	343	332	351	348	333	348	392	374	410	404	444
	25 – 29 years	1075	939	903	873	852	897	802	770	739	773	714	737	734	737	700	745	724
	30 – 34 years	717	731	706	734	708	727	748	753	762	785	731	810	699	731	696	711	703
	35 – 39 years	284	289	249	287	290	313	312	345	342	379	365	393	377	390	385	410	387
	40- years	51	51	41	55	60	61	69	66	64	73	80	92	95	77	84	88	78
	total	2806	2583	2424	2370	2342	2425	2326	2299	2301	2412	2268	2432	2344	2362	2332	2394	2390
	-19 years	3395,6	3372,4	3453,7	3398,9	3586,4	3506,4	3429	3375,9	3416,7	3605,6	3562	3403,3	3351,8	3481,6	3475,9	3359,3	3299,4
Average birth weight	20 – 24 years	3504,8	3494,2	3489	3498,3	3490,4	3470,8	3500,7	3531,2	3524,4	3464,4	3500,6	3590	3457,7	3500,9	3563,2	3497,6	3500,8
	25 – 29 years	3580,6	3557,6	3559,9	3546,5	3558,1	3577,4	3538,7	3568,5	3572,5	3572,1	3518,6	3544,9	3522,8	3518,9	3541,1	3526,7	3528,1
	30 – 34 years	3538,9	3546,2	3545,8	3580	3574,6	3588,2	3599,8	3561,1	3585	3610,2	3585,2	3591,2	3580,7	3568,5	3556	3581,6	3600,3
	35 – 39 years	3502,2	3554,4	3571,2	3535,3	3548,8	3510,2	3495	3640,9	3610	3572,1	3582,8	3586,4	3491,8	3527,1	3514,6	3584,8	3576,3
	40- years	3413,4	3417,8	3556,7	3607,4	3560,7	3483	3453,1	3462,6	3593,9	3653,3	3479,3	3370,6	3526,7	3436	3412	3524,1	3493,3
	total	3537,7	3534,6	3540,7	3546,4	3551,6	3551,6	3541,9	3565,8	3572,6	3572,2	3547,2	3563,9	3521	3529,2	3538,8	3545,5	3545,8
	-19 years	75	55	58	46	51	56	51	33	42	54	45	52	47	53	57	36	53
	20 – 24 years	599	515	460	374	378	369	340	331	351	345	330	345	390	373	409	402	441
Deliveries, number	25 – 29 years	1059	930	889	866	839	886	791	759	719	772	701	725	726	728	696	736	714
	30 – 34 years	700	715	690	721	697	713	731	738	748	780	720	801	694	720	691	702	696
	35 – 39 years	283	287	242	277	282	306	305	344	335	369	359	389	374	381	377	398	381
	40- years	51	51	41	55	60	59	68	63	63	72	79	92	95	74	82	86	77
	total	2767	2553	2380	2339	2307	2389	2286	2268	2258	2392	2234	2404	2326	2329	2312	2360	2362
	-19 years	18,3	17,9	18,1	18	18,5	18,2	18,4	17,9	18,2	18,1	18,1	18,2	18,3	18,5	18,3	18,2	18,4
	20 – 24 years	22,5	22,5	22,6	22,5	22,5	22,5	22,4	22,3	22,5	22,5	22,6	22,5	22,5	22,4	22,2	22,4	22,4
	25 – 29 years	27,1	27	27	27,1	27,1	27,2	27,2	27,1	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,1	27,1
Average age of mothers	30 – 34 years	31,7	31,7	31,6	31,7	31,8	31,8	31,8	31,7	31,7	31,8	31,8	32	32	32	31,9	31,8	31,8
	35 – 39 years	36,5	36,6	36,5	36,6	36,5	36,6	36,3	36,5	36,5	36,6	36,6	36,5	36,6	36,7	36,5	36,6	36,6
	40- years	41,2	41,6	41,1	41,6	41,2	41,4	41,5	41,2	41,6	41,3	41,1	41,4	41,3	41,4	41,3	41,6	41,4
	total	28,2	28,6	28,5	29,1	29,1	29,2	29,4	29,6	29,6	29,7	29,8	30	29,7	29,7	29,5	29,7	29,4
	-19 years	11	5	6	4	5	9	7	4	9	4	4	5	9	5	6	5	6
	20 – 24 years	74	60	54	55	53	53	46	37	39	44	36	31	52	30	42	41	41
	25 – 29 years	137	109	121	120	143	141	132	118	115	120	94	88	93	100	104	88	88
	30 – 34 years	98	112	143	124	136	130	150	118	119	117	96	133	110	112	102	101	90
Caesarean sections, number	35 – 39 years	57	58	50	75	67	78	92	75	64	83	91	77	79	77	70	77	83
	40- years	13	11	19	11	16	18	22	17	15	23	18	25	20	20	13	22	19
	total	390	355	393	389	420	429	449	369	361	391	339	359	363	344	337	334	327
	-19 years	25	26	16	10	9	15	14	12	12	20	11	8	6	8	10	4	5
	20 – 24 years	120	99	89	67	60	59	52	48	45	43	46	36	39	28	44	37	43
	25 – 29 years	171	129	115	97	99	77	90	49	52	48	37	38	58	42	34	40	31
	30 – 34 years	133	104	111	97	91	87	67	71	49	40	42	34	26	34	30	29	22
	35 – 39 years	69	70	39	33	48	37	37	52	32	34	24	28	19	22	23	21	15
Smoking in early pregnancy, number	40- years	10	12	11	13	8	10	13	9	8	10	9	9	7	8	10	4	7
	total	528	440	381	317	315	285	273	241	198	195	169	153	155	142	151	135	123
	-19 years	2	3	5	5	3	7	1	4	2	5	6	8	3	5	4	3	5
	20 – 24 years	49	44	32	37	34	37	23	32	27	21	38	38	34	26	34	43	38
	25 – 29 years	59	66	72	61	70	61	52	64	66	59	65	56	58	57	60	54	60
	30 – 34 years	50	47	30	41	58	52	49	59	49	56	70	63	57	57	46	51	41
	35 – 39 years	8	16	11	15	15	21	15	19	22	28	22	25	24	20	22	21	22
	40- years	3	3	1	3	4	4	2	2	4	3	5	5	4	2	2	6	4
Vaginal instrumental deliveries, number	total	171	179	151	162	184	182	142	180	170	172	206	195	180	167	168	178	170

Epidural block during vaginal deliveries, number	-19 years	13	18	15	15	18	23	16	11	10	28	18	20	26	33	35	22	21
	20 – 24 years	78	83	105	82	99	88	105	69	86	88	85	125	135	156	175	173	218
	25 – 29 years	99	109	156	150	131	150	146	130	139	154	151	204	175	225	234	250	262
	30 – 34 years	59	70	92	99	105	110	110	108	99	141	135	170	152	189	184	189	203
	35 – 39 years	23	23	29	33	28	33	26	30	42	57	49	58	67	86	84	83	83
	40- years	3	2	3	6	3	3	8	3	8	7	8	15	13	9	10	16	14
	total	275	305	400	385	384	407	411	351	384	475	446	592	568	698	722	733	801
Pudendal nerve block during vaginal deliveries, number	-19 years	1	5	5	3	2	2	2	1	0	3	1	2	1	1	0	0	0
	20 – 24 years	25	17	22	16	20	18	16	6	13	7	6	8	9	11	14	18	10
	25 – 29 years	61	34	37	37	35	35	32	20	22	22	34	19	14	23	12	18	21
	30 – 34 years	33	33	21	31	27	33	16	15	22	22	22	21	14	15	15	17	7
	35 – 39 years	11	11	7	7	8	13	10	7	8	7	7	10	8	5	6	9	3
	40- years	2	2	1	3	3	1	1	0	1	0	2	1	1	1	1	1	1
	total	133	102	93	97	95	102	77	49	66	61	72	61	47	56	48	63	42
Nitrous oxide during vaginal deliveries, number	-19 years	43	33	34	30	35	33	30	26	27	37	36	35	33	38	41	25	39
	20 – 24 years	367	343	252	220	243	236	235	226	258	238	247	267	264	290	299	302	335
	25 – 29 years	588	558	480	476	529	563	514	527	485	553	494	524	495	505	479	532	531
	30 – 34 years	367	385	326	377	397	447	430	479	501	517	517	543	449	493	459	499	487
	35 – 39 years	128	136	104	108	140	160	148	203	217	215	210	250	232	231	234	232	230
	40- years	21	19	15	26	23	24	30	24	35	31	47	43	52	39	51	51	48
	total	1514	1474	1211	1237	1367	1463	1387	1485	1523	1591	1551	1662	1525	1596	1563	1641	1670
Paracervical block during vaginal deliveries, number	-19 years	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	20 – 24 years	6	3	0	1	3	4	1	0	1	1	0	1	3	0	1	0	0
	25 – 29 years	25	7	5	10	5	3	0	4	0	2	0	0	1	1	3	3	2
	30 – 34 years	6	7	4	4	8	1	3	1	1	1	0	0	0	0	5	1	2
	35 – 39 years	5	2	2	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	40- years	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	total	43	20	12	23	19	12	4	5	2	4	0	1	4	1	10	5	5
Perineal ruptures during vaginal deliveries, number	-19 years	0	2	2	4	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	0	1	0
	20 – 24 years	14	10	8	5	8	9	10	6	5	4	11	7	6	12	5	11	12
	25 – 29 years	10	25	15	18	22	25	17	32	21	30	24	21	17	16	11	20	16
	30 – 34 years	12	14	13	15	17	21	17	14	20	23	23	25	19	16	12	8	12
	35 – 39 years	5	2	6	4	5	9	7	5	11	8	8	8	2	10	7	5	6
	40- years	0	1	0	0	3	3	0	0	1	1	2	0	2	0	1	0	0
	total	41	54	44	46	55	67	51	57	59	68	70	61	46	55	36	45	46
Birth weight under 1,500 g, number	total	16	14	19	16	20	12	17	17	15	17	15	18	19	12	19	16	11
Birth weight under 2,500 g, number	total	83	80	64	70	72	74	74	80	62	73	78	80	91	71	74	73	62
Stillbirths, per 1,000 births	total	2,8	3,5	2,9	2,5	2,6	3,7	3,4	6,1	2,6	2,9	2,2	2,9	2,1	5,5	2,6	2,9	6,7
Perinatal deaths, per 1,000 births	total	4,3	6,2	5,4	5,1	3,8	4,5	4,7	8,3	4,8	5,4	3,5	4,5	5,1	8	3	4,2	7,1
Dead within 7 days, per 1,000 live births	total	1,4	2,7	2,5	2,5	1,3	0,8	1,3	2,2	2,2	2,5	1,3	1,6	3	2,6	0,4	1,3	0,4
Length of gestation less than 33 weeks, number	total	24	29	30	23	35	35	36	34	26	31	34	36	31	33	29	34	24
Length of gestation less than 37 weeks, number	total	152	150	133	112	136	141	161	135	127	154	152	134	142	132	112	145	121
Multiple birth deliveries, number	total	37	30	43	30	38	33	39	30	41	19	34	28	18	32	18	34	29
Neonatal deaths, per 1,000 live births	total	2,5	2,7	2,9	3	1,7	1,7	2,2	2,6	2,6	2,9	1,8	2,5	3,8	3	0,4	2,1	2,1
Caesarean sections, per cent	-19 years	14,7	9,1	10,3	8,7	9,8	16,1	13,7	12,1	21,4	7,4	8,9	9,6	19,2	9,4	10,5	13,9	11,3
	20 – 24 years	12,4	11,6	11,7	14,7	14	14,4	13,5	11,2	11,1	12,8	10,9	9	13,3	8	10,3	10,2	9,3
	25 – 29 years	12,9	11,7	13,6	13,9	17	15,9	16,7	15,6	16	15,5	13,4	12,1	12,8	13,7	14,9	12	12,3
	30 – 34 years	14	15,7	20,7	17,2	19,5	18,2	20,5	16	15,9	15	13,3	16,6	15,8	15,6	14,8	14,4	12,9
	35 – 39 years	20,1	20,2	20,7	27,1	23,8	25,5	30,2	21,8	19,1	22,5	25,4	19,8	21,1	20,2	18,6	19,4	21,8
	40- years	25,5	21,6	46,3	20	26,7	30,5	32,4	27	23,8	31,9	22,8	27,2	21	27	15,8	25,6	24,7
	total	14,1	13,9	16,5	16,6	18,2	18	19,6	16,3	16	16,4	15,2	14,9	15,6	14,8	14,6	14,2	13,8
	-19 years	34,2	48,2	28,6	23,3	20	28,8	27,4	40	29,3	37,7	26,8	16	13,6	16	18,5	11,1	10,4

Smoking in early pregnancy, per cent	20 – 24 years	20,6	19,6	19,7	18,3	17	16,8	16,2	15	13	12,7	15,1	10,6	10,7	7,6	11	9,5	10
	25 – 29 years	16,6	14,2	13,3	11,4	12,7	9,2	11,7	6,7	7,4	6,4	5,8	5,4	8,4	5,9	5	5,6	4,4
	30 – 34 years	19,7	14,9	16,6	13,6	14,2	12,8	9,5	10	6,7	5,3	6,5	4,3	4	4,8	4,4	4,3	3,2
	35 – 39 years	25,4	25,6	16,8	12,3	18,8	13,2	12,9	16,3	10	9,4	7,5	7,3	5,3	6	6,4	5,5	4
	40- years	20	25	30,6	25	14,6	18,9	21,3	15,2	13,6	14,3	12,2	10,2	8	11	12,7	4,8	9,5
Vaginal instrumental deliveries, per cent	total	19,7	17,7	16,5	13,8	14,8	12,6	12,5	11,1	9	8,4	8,4	6,5	7	6,2	6,7	5,9	5,4
	-19 years	3,1	6	9,6	11,9	6,5	14,9	2,3	13,8	6,1	10	14,6	17	7,9	10,4	7,8	9,7	10,6
	20 – 24 years	9,3	9,7	7,9	11,6	10,5	11,7	7,8	10,9	8,6	7	12,9	12,1	10,1	7,6	9,3	11,9	9,5
	25 – 29 years	6,4	8	9,4	8,2	10,1	8,2	7,9	10	10,9	9	10,7	8,8	9,2	9,1	10,1	8,3	9,6
	30 – 34 years	8,3	7,8	5,5	6,9	10,3	8,9	8,4	9,5	7,8	8,4	11,2	9,4	9,8	9,4	7,8	8,5	6,8
Epidural block during vaginal deliveries, per cent	35 – 39 years	3,5	7	5,7	7,4	7	9,2	7	7,1	8,1	9,8	8,2	8	8,1	6,6	7,2	6,5	7,4
	40- years	7,9	7,5	4,6	6,8	9,1	9,8	4,4	4,4	8,3	6,1	8,2	7,5	5,3	3,7	2,9	9,4	6,9
	total	7,2	8,1	7,6	8,3	9,8	9,3	7,7	9,5	9	8,6	10,9	9,5	9,2	8,4	8,5	8,8	8,4
	-19 years	20,3	36	28,8	35,7	39,1	48,9	36,4	37,9	30,3	56	43,9	42,6	68,4	68,8	68,6	71	44,7
	20 – 24 years	14,9	18,2	25,9	25,7	30,5	27,8	35,7	23,5	27,6	29,2	28,9	39,8	39,9	45,5	47,7	47,9	54,5
Pudendal nerve block during vaginal deliveries, per cent	25 – 29 years	10,7	13,3	20,3	20,1	18,8	20,1	22,2	20,3	23	23,6	24,9	32	27,6	35,8	39,5	38,6	41,8
	30 – 34 years	9,8	11,6	16,8	16,6	18,7	18,9	18,9	17,4	15,7	21,3	21,6	25,4	26	31,1	31,2	31,4	33,5
	35 – 39 years	10,2	10	15,1	16,3	13	14,5	12,2	11,2	15,5	19,9	18,3	18,6	22,7	28,3	27,4	25,9	27,8
	40- years	7,9	5	13,6	13,6	6,8	7,3	17,4	6,5	16,7	14,3	13,1	22,4	17,3	16,7	14,5	25	24,1
	total	11,6	13,9	20,1	19,7	20,4	20,8	22,4	18,5	20,2	23,7	23,5	29	28,9	35,2	36,6	36,2	39,4
Nitrous oxide during vaginal deliveries, per cent	-19 years	1,6	10	9,6	7,1	4,4	4,3	4,6	3,4	0	6	2,4	4,3	2,6	2,1	0	0	0
	20 – 24 years	4,8	3,7	5,4	5	6,2	5,7	5,4	2	4,2	2,3	2	2,6	2,7	3,2	3,8	5	2,5
	25 – 29 years	6,6	4,1	4,8	5	5	4,7	4,9	3,1	3,6	3,4	5,6	3	2,2	3,7	2	2,8	3,4
	30 – 34 years	5,5	5,5	3,8	5,2	4,8	5,7	2,8	2,4	3,5	3,3	3,5	3,1	2,4	2,5	2,6	2,8	1,2
	35 – 39 years	4,9	4,8	3,6	3,5	3,7	5,7	4,7	2,6	3	2,4	2,6	3,2	2,7	1,6	2	2,8	1
Paracervical block during vaginal deliveries, per cent	40- years	5,3	5	4,6	6,8	6,8	2,4	2,2	0	2,1	0	3,3	1,5	1,3	1,8	1,4	1,6	1,7
	total	5,6	4,6	4,7	5	5	5,2	4,2	2,6	3,5	3	3,8	3	2,4	2,8	2,4	3,1	2,1
	-19 years	67,2	66	65,4	71,4	76,1	70,2	68,2	89,7	81,8	74	87,8	74,5	86,8	79,2	80,4	80,6	83
	20 – 24 years	69,9	75,4	62,1	69	74,8	74,7	79,9	76,9	82,7	79,1	84	85	78,1	84,6	81,5	83,7	83,8
	25 – 29 years	63,8	68	62,5	63,8	76	75,6	78	82,2	80,3	84,8	81,4	82,3	78,2	80,4	80,9	82,1	84,8
Perineal ruptures during vaginal deliveries, per cent	30 – 34 years	61	63,8	59,6	63,2	70,8	76,7	74	77,3	79,6	78	82,8	81,3	76,9	81,1	77,9	83	80,4
	35 – 39 years	56,6	59,4	54,2	53,5	65,1	70,2	69,5	75,5	80,1	75,2	78,4	80,1	78,6	76	76,2	72,3	77,2
	40- years	55,3	47,5	68,2	59,1	52,3	58,5	65,2	52,2	72,9	63,3	77	64,2	69,3	72,2	73,9	79,7	82,8
	total	63,7	67,1	61	63,4	72,4	74,6	75,5	78,2	80,3	79,5	81,8	81,3	77,7	80,4	79,1	81	82,1
	-19 years	1,6	0	1,9	2,4	0	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Birth weight under 1,500 g, per cent	20 – 24 years	1,1	0,7	0	0,3	0,9	1,3	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3	0,9	0	0,3	0	0
	25 – 29 years	2,7	0,8	0,6	1,3	0,7	0,4	0	0,6	0	0,3	0	0	0,2	0,2	0,5	0,5	0,3
	30 – 34 years	1	1,2	0,7	0,7	1,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0,8	0,2	0,3
	35 – 39 years	2,2	0,9	1	3	1,4	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3
	40- years	0	2,5	0	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birth weight under 2,500 g, per cent	total	1,8	0,9	0,6	1,2	1	0,6	0,2	0,3	0,1	0,2	0	0	0,2	0	0,5	0,2	0,2
	-19 years	0	4	3,8	9,5	0	0	0	0	3	4	4,9	0	0	2,1	0	3,2	0
	20 – 24 years	2,7	2,2	2	1,6	2,5	2,8	3,4	2	1,6	1,3	3,7	2,2	1,8	3,5	1,4	3	3
	25 – 29 years	1,1	3	2	2,4	3,2	3,4	2,6	5	3,5	4,6	4	3,3	2,7	2,6	1,9	3,1	2,6
	30 – 34 years	2	2,3	2,4	2,5	3	3,6	2,9	2,3	3,2	3,5	3,7	3,7	3,2	2,6	2	1,3	2
Length of gestation less than 33 weeks, per cent	35 – 39 years	2,2	0,9	3,1	2	2,3	4	3,3	1,9	4,1	2,8	3	2,6	0,7	3,3	2,3	1,6	2
	40- years	0	2,5	0	0	6,8	7,3	0	0	2,1	2	3,3	0	2,7	0	1,4	0	0
	total	1,7	2,5	2,2	2,4	2,9	3,4	2,8	3	3,1	3,4	3,7	3	2,3	2,8	1,8	2,2	2,3
	Birth weight under 1,500 g, per cent	0,6	0,6	0,8	0,7	0,9	0,5	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,5	0,8	0,7	0,5
	Birth weight under 2,500 g, per cent	3,1	3,2	2,8	3	3,2	3,2	3,3	3,6	2,8	3,1	3,6	3,4	4	3,1	3,2	3,2	2,7
Length of gestation less than 37 weeks, per cent	total	0,9	1,1	1,3	1	1,5	1,5	1,6	1,5	1,2	1,3	1,5	1,5	1,3	1,4	1,2	1,4	1
	total	5,5	5,9	5,6	4,8	5,9	5,9	7	6	5,6	6,4	6,8	5,6	6,1	5,7	4,8	6,1	5,1

Multiple birth deliveries, per cent	total	1,3	1,2	1,8	1,3	1,6	1,4	1,7	1,3	1,8	0,8	1,5	1,2	0,8	1,4	0,8	1,4	1,2
Low Apgar, per cent	total	0,9	1,1	1,3	1,3	1,1	1	0,6	1,4	1,5	0,9	1,2	1,1	0,9	0,7	1,1	1,2	1,1

The Health and Welfare Statistical Databases 14-08-18